





Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30548123>

Vol. 2.

DISSERTATIO MEDICA,
INAUGURALIS,
DE

Pneumoniae et sedis ejus Historia.

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,
Et nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

THOMAS NEUFVILLE,
EX INSULA JAMAICA.

Phoebe, fave, novus ingreditur tua templa sacerdos.

TIBULLUS.

Prid. Id. Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,
Academiae Typographos.

M, DCC, LXXVI.



308176

Fratri suo charissimo

J O S I Æ N E U F V I L L E,

A R M I G E R O,

Sibi non magis forte nascendi

Quod frater natus major est,

Quam virtutibus animi,

Et verâ probitate

Colendo honorandoque :

Item,

Viro egregio

J O A N N I M O R S E,

A R M I G E R O,

Ob humanitatem et amicitiam,

Qua erga se tutoris,

Absente patre, officio functus est :

Denique,

Viro docto et ingenioso

J O A N N I S Q U I R E

W A N D S W O R T H I Æ,

In agro Surriensi

Chirurgo, nemini artis suae

Peritia secundo;

Suo in medicinae tyrocinio

Praeceptorum pariter ac amico;

Has studiorum medicorum primitias

Exiguum, sed grati animi, testimonium,

D. D. C. q.

A U C T O R.

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

Pneumoniae et sedis ejus Historia.

I. **P**ENSUM, quod, ut peritiae medicae exemplum, academiae leges a laureae petitoribus exigunt, cum necessario mihi suscipiendum hoc tempore sit, de thoracis cavi inflammationis signis externis et sede scribere decrevi. Hanc, quia plus, quam quaelibet una istius loci inflammatio, cui simplex nomen auctores dederint, diversasque habitas, et alio aliam nomine nuncupatas, comprehendit, ne quidvis notorum nominum falleret, novo imposito Pneumonia

niam appellavi. Nova logica Verulamiana, seu rerum verarum inductione, hanc historiam omni membro stabilire in animo mihi est, e fidissimis gravissimorum auctorum symptomatum praecipuorum observationibus, et cadaverum incisionibus, materiam omnem tracturo. Qui labor, haud paulo, quam inexperto videretur, major, eo acceptior legentibus esse debet; quod nihil dubium, nihil anceps aut incertum, ratione mera suspicabile nihil tradetur; contra, omnia evidente rerum verarum fide firmabuntur. Inde morbi discrimina, inde pathologiam illustraturae rationes graves, inde causarum remotarum explicatio, et medendi denique consilia, quasi ex puro fonte, profluent. Ut a definitione incipiam, signa, quibus cognosci pneumonia, et ab aliis morbis dignosci, queat, sunt, ‘Pyrexia *, spiritus difficilis, tussis ‘et alicubi thoracis dolor †;’ quorum singula, quo illustrior morbi natura sit, paulo fusius persequar.

HISTO-

* Cull. gen. morb. cl. 1. Charact. p. 227.

† Cull. prim. Lin. cui titulus est, First lines, cccxxiv.

H I S T O R I A M O R B I.

II. Semper fere cum frigore febrili, horrore, aucto calore, crebris pulsibus, et robore imminuto *, morbus est. Et si quo in malo, quod

* Haec pyrexia Hoffmanno ‘ febris acuta inflammatoria’ dicitur; Med. Rat. Syst. tom. 2. sect. 2. cap. 6.; sect. 1. p. 136. et sect. 4. p. 137. Clegh. diseases in Minorca, c. 6. p. 261. 262. Boerhaav. Aphor. 820. et 875. Morg. de sed. et caus. morb. epist. 21. n. 23. 27. 33. et sexcentis praeterea locis per hanc passim, et 20. epist. Morgagnius adeo praesentiam febris necessariam judicat, ut in pneumonicis, quos a praeceptore suo Valsalva acceptos tradit, casibus, si quando vox *febris* abest, eam pro subintellecta habeat; ut epist. 20. n. 27. Cujus haec verba sunt: ‘ Qua ratione levis febris conjuncta fuerit cum peripneumonia? hunc enim morbum fuisse in eo viro, Valsalva, qui et viventem vidit, et mortuum secuit, non dubitabat; titulum enim huic observationi adscripsit, De pulmonia.’ Triller. de pleurit. aphor. 1. Ægrot. prim. p. 62. secund. p. 72. Cull. prim. Lin. cccxxv. Omnibus xxxii casibus hujus morbi, quorum historias contexuit, et in xi quorum post finem etiam visa in cadaveribus commemorat Frederic. Wendt,

quod alioquin pro pneumonia iusta habeas,
neque calor neque pulsuum crebritas * cre-
verunt, pleuritis spuria aut pleurodyne †,
aut

Wendt, exceptis illorum izmo, horum octavo decimo-
que, in quibus tantum non diserte memoratur, pyrexia,
quam ille febrem dicit, perpetuo haerebat. Sandi-
forth. thesaur. Eadem in x. Trillero expositis manifesta
quoque erat.

* Clegh. loc. relat. p. 264. ‘ Aliquibus,’ inquit, ‘ ca-
‘ lor corporis mediocris, quibusdam minor naturali e-
‘ rat, sed plerisque adeo intensus, ut mercurium in
‘ thermometro ad cii. quandoque ad civ. gradum tol-
‘ leret.’ Et paulo post, ‘ pulsuum naturali modo, vel
‘ etiam tardiozem, reperisse sese dicit. Eodemque per-
‘ tinentem ex O’Connol, de morb. acut. p. 235.
‘ sententiam refert; cujus haec verba sunt.’ ‘ Pulsuum
‘ in pleuritide minus celerem aut fortem (febre tamen
‘ acuta in summo vigore nihilominus subsistente) saepius
‘ notavi.’

† Hoffman. loc. relat. sect. 2. Boerh. Aphor. 878.
Cull. praelect. de usu, et Gen. morb. G. xxii. synonymina
auctorum; ubi ille, hos adfectus rheumatismo adnume-
rat. Qui ipsi affectus, si pro rheumaticis habendi, et
sine tamen calore et pulsuum frequentia adauctis, sunt,
id minori morbi vehementiae tribuendum est.

aut capitis affectio subesse *, aut alius morbi hoc symptomata esse †, suspicanda sunt.

III. Pul-

* Quale coma est. Ita, ‘ multos somnolentos aut in somnum proclives’ apud Clegh. p. 263. et passim loc. relat. Morgagn.

† Cave, quod multi faciunt, symptomaticos casus cum idiopathico confundas. Vid. et Morg. de fed. et caus. morb. epist. xxi. n. 11. 12. 13. 14. Qui casus catarrhi uterque erat effectum. Priori praecesserat catarrhus, ut ipse auctor fatetur, in qualem plus minusve senes fere omnes proclives sunt, et neque ‘ gravans in thorace, neque pungens dolor’ suberat; loc. relat. n. 11. Eoque ab hoc nostro morbo, docente definitione (1.), aliena erat; magisque hoc, quod et pyrexia, et omnia alia, affectus pneumonicos comitari solita, aberant. Et, si aut protinus ante fatum aut priore aliquo tempore inflammatio subfuerat, ea obscurarum earum in numero fuerat, quae, in parenchymate existentes, nullum sui praesentium indicium, superante vita, edunt. Eodemque Vallisnerii casum exitialem, non inciso quamvis cadavere, pertinere, vix dubitabile est. Ubi, praeter catarrhi contagiosi per Italiam M, DCC, XXX forte grassantis, nec gravia quidem symptomata, nihil, nedum quod pneumoniam nostram declararet, erat. Facies, respiratio, vocis vis, et caetera ejusmodi, quorum, spectando audiendove, ferri judicium potest, omnia, qualia in sano solebant esse, deprehensa sunt. Epist. relat.

III. Pulsus, praeter crebritatem fere perpetuam (I.), etiam pleni, validi, duri, citique*; aliquando in aliis iisdemve alias alii et abnormes † nonnunquam, praesertim provecto aut ad mortem tendente morbo, debiles, exiles, molles, et inaequales sunt; est ubi deficiunt ‡.

IV. Py-

relat. n. 13. Haec fere ita die iv. et v. erant. Postridie, quid factum sit, ex Morgagnii verbis iudices. ‘ Facies
‘ decolor, demissa, concidens, respiratio difficilis, vox
‘ humilis et languida, et tanquam ex profundoeducta;
‘ expectorata materia omnino perpauca, crudiuscula, et
‘ permisto hic illic sanguine obsoleti coloris, infecta.’
Sed ipse sibi ad paucas ante mortem horas non pejus, sed melius, se habere visus est. Periit denique sine ullo symptomate, nisi quod pulsum subinde intermissiones, quae aliquot ante annis fuerant, hoc tempore solutae sunt, et paululum fitis accesserat.

* Cull. loc. relat.

† Cleghorn. loc. relat. p. 264. ima. Morgagn. lib. relat. passim per epistol. 20. et 21.

‡ Cull. libel. et loc. relatis. Boerhaav. Aphor. 826. Statum pulsum, licet in omnibus, mox memorandis, casibus is non memoretur, quodam tamen tenus primae quatuor tabulae monstrabunt. Quarum prima ab epistolis Morgagnianis 20. et 21. altera a Trillerianis decem

IV. Pyrexiam aliquando praecedunt *, aliquando comitantur †, haud raro aliquot horarum spatio subsequuntur ‡ symptomata (I.), deinceps plenius memoranda, praeter caeteris dolor ||.

V. Tussis, a pneumonia raro dissociabilis, major aut minor, aliquando sicca, praesertim ab

decem casibus, tertia ab undecim casibus aegrotantium, quorum post mortem corpora incidit Fridericus Wendt, quarta a 32. casibus ab hoc expositis, quorum plerique non exitiales extiterunt, petitaе sunt. Vid. tab. i. ii. iii. iv.

* Clegh. loc. relat. p. 262. ima.

† Morg. passim per loc. relat.

‡ Cull. loc. relat. ‘Certum,’ inquit egregius Boerhaavii interpres, ‘tempus, quo ille dolor memoratae symptomata sequitur, non est, in quibusdam citius, in aliis ferius apparet. Observavi quandoque prima incipientis morbi hora dolorem satis acutum; et contra observavi, pleuritides verno tempore anni 1729, ubi secundo die morbi dolor oriebatur, neque adeo acutus tamen, et interim omnes tales aegri admodum periclitabantur.’ Comment. ad Boerhaav. aphor. 883. vol. 3. p. 19.

|| Quemadmodum haec res se habeat, tabulas v. vi. vii. viii. consule. Quarum quinta e Morgagnii epistolis xx. et xxi. sexta a Trilleri x. casibus, septima ex eorum historiis, quorum cadavera Fridericus Wendt incidit, octava ex iis casibus apud eundem Fred. Wendt quo-

ab initio, est. Eadem sæpius, etiam ab initio, humida, sputum colore varium, nunc liquidius, nunc spissius, alias copiosius, alias parcius, aliquando per aliquam moram nullam, sæpe sine sanguine, sæpe eo tinctum, trahit *.

VI. Spiritus, perpetuo, maxime inter trahendum, difficilis, cum, quia aegre pulmones explicantur, tum ob augescentem ex ea re dolorem, est †. Plerisque corpore in latus labo-

quorum omnes, tribus exceptis, convaluerunt, petitaæ sunt. In unaquaque, nam duplex quaeque est, columna, prior febrem non priorem, posterior priorem esse denotant. Observationes figuris Arabicis exprimuntur.

* Vide infra annot. ad †.

† Cull. prim. Lin. cccxxvii. Clegh. loc. relat. p. 262. Sydenh. de peripneum. noth. sect. 6. c. 4. n. 2. 7. Boerh. aphor. 826. Hoffm. M. R. S. tom. 2. sect. 2. cap. 6. sect. 4. Morgagn. epist. relat. passim. Quo clarius tussis, sputorum, et spirandi status perspiceretur, eum tabulis quatuor, nempe, ix. x. xi. et xii. exponendum judicavi. Quarum idem, qui ante, ordo est, nempe prima Morgagnii epistolas 20. et 21. altera Wendtii casus, præter tres ultimos ad salutarem finem perductos xxxii. tertia ejusdem viri exitiales xi quarta Trillerianos x. respicit.

laborans *, multis in integrum †, inclinato, commodior decubitus, quem multi, nisi supini ‡, haud pauci, nisi erecta cervice ||, non ferunt **.

B. 4. VII.

* Clegh. p. 263. Cul. loc. relat.

† Morgagn. de fed. et caus. morb. epist. 20. n. 17. et alibi hac et sequent. epist. Boerhaavius 'decubitum in unum modo, id est, in affectum latus, tolerabilem' dicit. Morgagn. ead. epist. n. 16. 3. et alibi. Qui hoc 19. explicare conatur, de quo propediem.

‡ Morgagn. epist. relat. n. 22. xx. n. 18. Cull. loc. relat. Vide tabulam decubitus.

|| Morgagn. xxi. n. 27. Cull. loc. relat.

** Utrum affecto latere, an non affecto, an neutro, facilius decubitus sit, in tabula xiii. videbis. Quam confer cum tabula xviii. quae decubitus quoque est, et ubi, sive dextrum, sive sinistrum, latera, sive alibi thorax, doleant, qua in parte, quove modo jacentis tolerabilior decubitus sit, addiscere poteris. Hae duae tabulae, xiii. scilicet, et xviii. e Morgagnii saepius jam relatis locis sumptae solis sunt; nam ex Friderico Wendt ideo tabulam nullam decubitus accepi, quia ad hunc is parum adjecisse animum videtur. Secunda Trilleri aegrotans supina, sed sensus expers, jacuit; quintus situm centies mutavit, delirus etiam: Septimus sinistro

VII. Dolor, alii aliam thoracis partem, plerisque alterutrum latus obtinet *. Dextrum

sinistro latere dolebat, solo dextro jacebat: Octavus neutro latere et solo tergo cubabat. Praeterque haec, nulla apud illum decubitus ratio reperitur.

* Vide tab. xiv. xv. xvi. xvii. Quarum decima quarta ex Morgag. loc. supra saepius relat. decima quinta e casibus Wendtianis, ad salutem praeter tres perductis, xxxii. decima sexta e casibus ejusdem exitialibus, decima septima e decem Trilleri, acceptae sunt. Et Clegh. loc. relat. p. 263. ubi, e sexaginta, eodem tempore aegrotantibus, quadraginta dextro latere dolebant. Ex xli casibus Morgagnianis, partim a Valsalva, partim ab ipso, tractatis, rejectis tribus, nempe 24to et 33tio epist. xxi. et 26to epistolae xx. ubi pars dolens aut non memorandus, ut in primo trium, aut non memoratus erat, in uno nempe 13mo, epistolae xx. dextrum latus, et sterni medium; in tribus, scilicet epistolae xx. 16to et 20mo, et epistolae xx. 27mo, utrumque latus, indoluerunt. Ex reliqua summa dextri lateris, ad sinistrum dolentis, ratio erat 12 ad 10; ad thoracem alibi dolentem 12 ad 7. Vide tabulas xiv. xv. xvi. et xvii.

Ex casibus Wendtianis xliii, in tabula xv. et xvi. expositis, rejectis duobus, nempe 18. tab. xv. ubi latus dolore, sed quis, non, dicitur, et 11, tab. xvi. ubi spiritus officina in solito pondere premi et dolores tuf-

ficula

trum latus aliquanto saepius, quam finistrum afficitur. Aliquando, neutri contentus ad morbi finem dolor, ab altero ad alterum latus migrat, vel ita transit, ut prius affectum non

ficula adaugeri, dicuntur, sed pars dolens non declaratur; in uno, nempe 8vo, tab. xv. dextrum latus die primo, die 2do post sanguinis detractionem finistrum, indoluerunt; et in altero, nempe 25to ejusdem tab. xv. primo die finistrum acerbè doluisse, dein die 2do in dextrum mutuo contactu propagatus, dolor praedicatur; item in tab. xvi. casu 4. finistrum primum, dein die 3tio dextrum, et in casu 6to ibidem prius dextrum, dein die 4to finistrum dolore affecta sunt; denique, in 7mo ejusdem tabulae, dolor dextri lateris die 4to finistrum etiam, non deserto prius affecto, affecit. Ex reliqua summa, dextri lateris, ad finistrum dolentis, ratio, si utramque, nempe xv. et xvi. tabulam comprehendis, erit 19 ad 14. Quodque ad thoracis, alibi dolentis, rationem attinet, xv. casus non ad rem attinet, quippe ubi dolores maxime vagi incertique ad nullam unam partem referendi essent; eoque dextri lateris dolentis, ut 19 finistri, ut 14 ad thoracem alibi dolentem, ut 1 est. Proximam his tabulam, nempe, xviii. de industria omittimus; quia ejus casus ex plurimis lecti erant, unde nulla summae rei ratio haberi potest.

non deferat *. Idem modo sub sternone aut circa hoc †, modo in tergo inter scapulas ‡, et in laterum alterutro nunc superius ||, nunc inferius §, nunc antè ¶, nunc posterius **, longe sæpiissime sextam aut septimam costam mediae fere longitudinis, vel paulo antè ††, occupat. Idem, ubicunque, et præcipue, si in latere, maximeque si in costa relata, sedet multo sæpius vehemens et pungens, aliquando sed multo rarius obscurior et obtusior, cum ponderis potius quam doloris sensu, est. Immo rarissimum est, non aliquo

* Trill. aegrot. v. iv. vii. Frid. Wendt, ex casibus xxxii. xxv^{um}. Vid. tab. xv. ibid. cas. 8. ibid, tab. xiv. cas. 16. 20. epist. xx. et ibid epist. xxi. cas. 27.

† Tab. xiv. column. 3. epist. xx. ob. 11. 13. 45. et xxi. 30. et ibid. column. 1. ob. 30.

‡ Tab. xiv. column. 3. ob. 53. epist. xx. et ob. 24. epist. xxi.

|| § ¶ ** †† Vide passim tabulas doloris et loca unde relata sunt, et Cull. pr. Lin. cccxxviii. ‘ Verum,’ inquit Van Swieten, ‘ dolor latus alterutrum occupat, ‘ quandoque dorsum, pectoris anteriora et omnia illa ‘ loca, quae § 877. recensentur.’ Comment. ad Boerhaav. aphor. 883. vol 3. p. 19.

quo currentis morbi tempore pungentem aut vehementem dolorem esse ††.

†† Vide tabulas doloris, ubi longe frequentissime dolorem pungentem reperies. Ita in tab. prima doloris, in serie tabularum, xiv^{ta} dolor vehemens aut pungens aut magnus in his casibus, epist. xx. 35. 39. 41. 43. 47. 49. 55. et epist. xxi. 17. 19. 23. 29. 30. 35. 36. et epist. vii. 11. ad numerum igitur quindecim est. In epistolae xx. casibus, 3. 4. 11. 13. 16. 20. 26. 51. 53. 59. 61. et epistolae xxi. 24. 32. nempe numero tredecim, qualis dolor fuerit, non memoratur; sed non pungentem aut alioquin modo suo memorabilem diligentia Valsalvae, Morgagnii cura, mentis acumen, item magna fides, animusque ad hanc rem nunquam non intentus, suadent. In his casibus, nempe epistolae xx. 9. 17. 33. et epistolae xxi. 27. 34. ad numerum quinque dolor gravis, obtusus, levis, aut alioquin non pungens, vehemens aut magnus, esse dicitur. Ergo, rejectis 13 illis, ubi doloris modus non memoratur, casibus, doloris pungentis ad obtusum ratio est, ut 15 ad 5, vel triplo major. Quae lux hinc diagnosi affulgeat, manifestum est. Videamus deinceps ejusdem hujus rei apud Fridericum Wendt rationem. Ita in tabula xv. et xvi. dolor acutus, atrox, praeacutus, acerbus, acerbissimus, acer, mordens, lancinans, saevissimus aut pungens. (quibus omnibus vocibus res eadem, nempe pungens, magnus aut vehemens, non obtusus, levis, aut gravans, dolor intelligitur), in his tertiae tabulae casibus i. ii. iii. iv.

vi. vii. viii. ix. x. xi. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xx. xxi. xxii. xxiii. xxiv. xxv. xxvi. xxvii. xxix. xxx. xxxi. xxxii. item in his quartae tabulae i. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. esse dicitur. Ideoque, hoc viro teste, doloris pungentis ad obtusum est, ut 35 ex 43, etiamsi in reliquis octo dolorem gravantem fuisse concederetur. Quod utique concedendum non est; nam in quinto casu tab. xv. et primo et primo tab. xvi. qualis dolor sit, non dicitur. His igitur tribus rejectis, soli tres casus erunt ubi dolor gravans esset, nempe, tab. xv. xii. xix. et xxviii. Et totius rei ratio ut 35 doloris pungentis ad 3 gravantis, erit.

His omnibus perpensis, et cum interiore morbi sede comparatis, quam gravissime plerique medici erraverint, qui obtusum dolorem et acutum ex diversis sedibus pendere, et diversas morbi species constituere, nempe ab illo peripneumoniam, seu pulmonum inflammationem; ab hoc pleuritidem, seu pleurae costas succingentis inflammationem, esse, existimarent, facile cuique et primo intuitu patebit. Rectissime igitur optimus praeceptor noster et nosologus suam hactenus nosologiam corrigendam, genusque x. pariter et xi. pro uno eodemque morbo habendum, Primis suis Lineis ostendit. Vide Pr. Lin. ejus cccxxix. et cccxxx.

TABULA I.

XX.

Pulsus

- 9 Frequentes, celeres, duri,
die 3tio, magis inaequales;
die 4to, deficientes.
- 33 Frequentes duri, non valde tur-
gidi.
- 41 Sub morbi finem indies. deficien-
tes.
- 59 Frequentes, celeres, parvi, debi-
les.
- 30 Frequentes, celeres, debiles, inae-
quales, intermittentes.

XXI.

- 19 Inaequales, crebro intermittentes,
frequentes.
- 17 Magni et frequentes primum, de-
in et duri ad paucos ante mor-
tem horas.
- 23 Frequentes, parvi, et nonnihil in-
aequales.
- 34 Duri, maxime confusi, inaequales,
intermittentes, nec interdum sine
doloribus convulsivis.
- 29 Frequentes, parvi et digitis parum
resistentes.
- 30 Di. 5to, pleni et duri, eodem dein
frequentes, aequales, non duri;
die 7mo; minores, frequentio-
res: 8vo, parvi, digitis parum
resistentes.
- 27 Subduri, et digitis semper ad mor-
tem usque resistentes.
- 32 Minores, et debiliores.
- 35 Tensi, intermittentes, postremo
paulatim deficientes.

¶ Annotatio. In reliquis casibus, a-
lias nobis relatis, pulsuum status non
memoratur.

TABULA II.

Pulsus

- I. Duri, frequentes, ferrati.
- V. Ab initio sat validi, fortes, et du-
ri.
- VI. Duri, frequentes, ferrati, inae-
quales die 7mo.
- VIII. Duri, frequentes, ferrati.

TABULA III.

Pulsus.

- IV. Duri, frequentes.
- V. Inaequales die 8vo.
- VI. Die 4to, frequentes, 6to, celeri-
ores aucto ardore, 7mo fere
naturales, 11mo, frequentes.
- VII. Die 2do, celeres, duri.

TABULA IV.

Pulsus.

- VII. Duri, frequentes, die 8vo, fre-
quentiores, 10mo, fere sani.
- VIII. Die 2do, duri, frequentes.
- XI. Duri, frequentes.
- XII. Frequentiores.
- XVI. Die 9no, frequentiores.
- XX. Celeres, elevati.
- XXIII. Die 15mo, sani.
- XXV. Celerrimi.

TABULA

TABULA V.

XX.

XX.

3	30
5	27 XXI.
7	32
9	35
13	
16	Quoties, ut in
17	casibus, epist.
20	XX. quorum in-
26	cisionem Valsal-
33	va curarat, vox
35	febris, ei non
39	memoratur, eam
41	tamen subintel-
43	ligi, Morgagni-
47	us, epistol XX.
55	n. 4. ostendit.
59	Idemque de casu
61	24. epist. XXI.
17 XXI.	dicendum ex e-
19 An antefuit do-	odem dicto con-
lor?	cludendum est.
23	
24 An febris subin-	
telligitur?	

34

29

30

Hic dolorem
prius existen-
tem manifeste
secuta febris
est.

I.
II.
III.
IV.
V.
VII.
VIII.
XIV.
XVI.
XXI.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

XII. { Ante fri-
gus dolor.

XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.

TABULA VI.

I.

II.

VII.

III.

IV.

V.

VI.

VIII.

IX.

X.

TAB. VII.

I.

IV.

II.

VI.

III.

IX.

V.

VIII.

VII.

X.

T A B. VIII.

VI.

Die 2do, dolores.

IX.

Die 4to, dolores.

X.

Secutus sub noctem
dolor.

XI.

Die 3tio, lancinatio.

XV.

Die 3tio, dolores
vagi.

XVII.

Die 2do, dolor

XVIII.

Post communiorem
affectum phlogisti-
cum manifestior
die 2do, febris, se-
cutumque aestum
lancinatio comita-
tur.

XX.

Sequente nocte do-
lor.

XXII.

Die 2do, dolores.

XXIII.

Die 4to, dolor.

TABULA

TABULA IX.

TUSSIS.

SPUTA.

SPIRITUS.

X. 3	Tussis.	Sputa sanguine tineta post viri- descencia.	Difficilis.
5		Purulenta, multas horas ante mortem suppressa.	
7	Vehemens.	Aliqua.	Difficilis.
9	Molestior.	Aquosa et livida, die 3tio par- ciora, valde crassa, densa, al- bescentia interdum et flava, suppressa nocte 4ta.	Spirandi difficultas, die 3tio aucta.
13	Multa.	Parca.	
16	Tussis.		
17		Nulla, die 4to spumosa, rosea, multa.	Difficilis die 4to ingens.
20		Multa.	Difficilis.
26		Aquosa, uberrima, progrediente morbo pauca, viscida, lenta, et nonnihil graveolentia.	Difficilis quasi a catarrho, de- in difficillimus, denique suspiciosus, solusque erecta cervice.
30	Tussis primis diebus nonnihil perpaucos post.	Humida. Sicca et irrita.	Gravis ante pneumoniam
33	Tussis importuna.	Cruenta.	
35	Tussis.	Nulla.	Spiritus difficilis.
41	Tussis.	Pauca.	Spiritus difficilis, sed non dif- ficillimus.
39	Tussis plurima.	Plurima, copiosissima, crassa, flava, lineis sanguineis paucis distincta, tandem suppressa.	
43	Tussis.	Progrediente morbo, sanguine tineta, uno die non pauca.	Difficilis.
45	Tussis permolesta.	Nulla.	Laboriosus.
47	Tussis.	Vix ulla.	Dolore abeunte gravior sem- per spirandi difficultas.
49	Tussis.	Sicca, crassa aliquando.	Gravior fit.
51	Tussis.	Paucæ materiae et sanguineo colore tinetae.	Difficilis.
53			Spiritus erecta cervice.
55	Tussis.	In principio aliqua, postremo suppressa.	
59	Tussis inanis.		Frequens.
61		Primum modica, nec glutinosa, tandem rotunda et purulenta.	Cum dolore.
XI. 17			Frequens sed non pessimus.
19	Tussis crebra, latratui similis.	Crassa, in iisque albæ particu- lae, quasi polyposae, postea sanguis in iis, postremo im- minuta.	Difficilis.
23			
24	Tussis.	Nulla, certe quæ attinerent ad morbum.	Difficilis.
27	Tussis prorsus irrita.		Difficilis.

29 Tussis.

T A B U L A IX. Continuata.

TUSSIS.

SPUTA.

SPIRITUS.

29	Tussis profunda et prorsus irrita.	Ex ore humor aquae instar spumosae in qua caro recens locuta sit.	Difficilis.
30		Crassa spumosa, variegata ex flavis, die 5to cruda, flava, fluida, sine spuma.	Difficilis, die 7mo frequentior.
32	Tussis, sicca primum	Pus cinereum, lividum, foetidum, incruentum.	Spiritus non nisi erecta cervice.
33	Tussis.		Difficilis.
34	Multa tussis.	Viscida, sanguinolenta, et non multa.	Erecto corpore.
35		Non sine aliqua sanguinis tinctura apparentia, non processerunt	
36		Fluida et rufa.	
VII. 11		Nulla.	Difficilis.

T A B U L A X.

TUSSIS.

SPUTA.

SPIRITUS.

I.		Subcruenta; die 2do et 3tio eadem sed pauciora; die 4to flava, multa; 5to larga; 8vo, copiosa et viscida usque ad 11 diem.	Die 4to difficilis et stertorosus.
II.	Tussis.	Die 3tio sanguinea; die 6to alba, et 7mo et usque ad 11 decrescentia quotidie.	
III.		Quaedam cruore tincta; 5to alba, copiosa; ab 11 ad 14 alba.	Interclusus.
IV.	Tussiendi inanis cupiditas.	Post 10 diem purulenta, copiosa; 25to cessaverunt.	Brevior; post 10 liberior.
V.		Die 4to et 5to cruenta, 6to alba.	Impeditior.
VI.		Die 8vo alba et sequentibus diebus.	
VII.		Sanguineis striis distincta; die 8vo cessaverunt; 9no alba.	Difficilis.
VIII.		Alba; sub diei 7mi finem copiosiora.	Die 2do praeclusus.
IX.	Tussis, die 4to pertinax.	Die febris 4to, doloris 1mo cruenta; 5to pauca; sanguine misso, liberaliora, cocta, flava; die 7mo flava, copiosa et 8vo.	2do die doloris, 4to febris anhelosus; 6to molestior.

TABULA X. Continuata.

TUSSIS.

SPUTA.

SPIRITUS.

- X. Tussis, die 4to Die 3. et 6to alba; 7mo et 8vo Die 2do summe angustus;
dolorifica. nigra; 9no alba, usque ad 4to, difficilior.
- XI. Tussis humida Die 4. sputa ac ante morbum; Die 4to molestior; 9no in-
ante morbum. 7mo et 8vo cessant, cum ma- tercisus et suspiriosus, san-
lo effectu; 9no, sanguine de- guine detracto facilis.
tracto, copiosiora et magis co-
acta, ad 18vum producta
- XII. Die 5to alba et 7mo, 8vo, 9no, Saepius interruptus.
10mo.
- XIII. Die 4to alba paucis striis san-
guinis distincta; die 5to,
6to, 7mo, 8vo, ad 9num e-
adem; die 9no flava ad 14.
- XIV. Tussis. Cruenta; die 4to cessant, vena Difficilis.
incisa, cocta, matura, flava,
multa; 6to suppressa; et 8vo
commoda.
- XV. Cruenta; die 4to alba, copio-
sa; purulenta (a 7mo) ad
10mum.
- XVI. Tussis, die 2do Sanguinea; die 5to copiosiora Impeditior.
dolorifica. et purulenta.
- XVII. Sanguinea; die 4to alba ad Dyspnoea aliqua.
8vum.
- XVIII. Tussicula die 2do. Die 3tio alba, 7mo pauciora. Molestus spiritus.
- XIX. Tussis frequens. Alba; die 2do, suppressa. Difficilis.
- XX. Tussis continens. Die 2do sanguinea; die 3tio Anhelosus, suspiriosus, labo-
cruenta assatim; die 5to fla- riosus; nocte 6ta difficilli-
va; 6to larga, facilia; 8vo mus; die 9no suspiriosus et
pinguia, multa; 11mo flava, intercisus.
copiosa.
- XXI. Pauca, nigricantia; 3tio eadem; Molestus.
4to albida; 5to alba, pauca;
6to magis cocta; 8vo ad
14mum, copiosa, pingua, al-
ba.
- XXII. Alba; 4to albida; 6to alba cum Interceptus.
summo dolore.
- XXIII. Tussis. Die 5to, tussi expressa cruenta; Impeditus, die 6to expeditior.
6to eadem; et 11mo ad 12
copiosiora; 15to non cruenta,
copiosiora, aut parciora ad
20mum.
- XXIV. Die 10mo, sanguinea, 11mo co-
piosiora et flava ad 17mum.
- XXV. Tussis cum sum- Die 3tio cruenta; 5to suppressa; Die 5to cum gemitu et la-
mo dolore. 7mo cocta, pingua, flava, af- mentatione.
fatim sine molestia; eadem ad
24tum.

T A B U L A X. Continuata.

TUSSIS.

S P U T A.

S P I R I T U S.

- XXVI. Tussis die 9no ferina. Die 9no tandem cruenta; 10mo sanguineis striis distincta; 14to purulenta, insigniter copiosa usque ad 22dum.
- XXVII. Alba; 6to nulla, exacerbati dolores; 7mo pinguis, multa, copiosa, coacta; 10mo absoluta.
- XXVIII. Tussis. Die 3tio sanguinea; 6to et 7mo cruenta adhuc; 8vo sine doloribus, larga, flava.
- XXIX. Die 5to flava, ut et 6to; die 7mo imminuta, doloribus majoribus.
- XXX. Tussis. Die 4to cruore mixta; 5to imminuta, faevissimis doloribus; 6to pauca, purulenta, spumosa; plurimus inde in pectore strepitus.
- XXXI. Tussis. Die 7mo et 8mo tussendi intercepta potestas. Die 2do anhelosus redditus, 4to suspiriosus; 7mo et 8vo gemebundus, strepens; 9no stertorosus.
- XXXII. Tussis pertinax die 4to sicca. Cruenta, item die 2do et 3tio; post tertiam sanguinis detractionem, die 4to flava, matura, nullo sanguine tincta; 5to eadem; 10mo ad 14tum pauca.
- Die 25to reddit.

T A B U L A XI.

TUSSIS.

S P U T A.

S P I R I T U S.

- I. Tussis fere nulla. Nulla fere. Angustissimus, 7mo gemebundus.
- II. Die 2do biliosa, purulenta; 3tio, cruenta, sequentibus ad 8vum diebus copiosa, cocta, flava. Incisa vena die 2do liberior, 8vo haud difficilis.
- III. Tussicula. Nulla, deficientibus viribus. Cum faevo dolore.

IV.

TABULA XI. Continuata:

TUSSIS. SPUTA. SPIRITUS.

V.	Pauca, cruenta.	Suspiriosus, ejulabundus;
		die 3tio liberior, sub vesperam cum strepitu; 4to difficillimus.
	Flava, biliosa; die 7mo strepitus in pectore ex sputo; 8vo flava, pauca.	Die 6to, interceptus; 7mo, liberior.
I.	Die 2do cruenta; 3tio striis sanguineis distincta, sub vesperum alba, nullum pus rejectum; 6to quaedam; 7mo coacta, copiosa, subflava; 11mo pauca; 14to nulla	Die 3tio molestissimus cum gemitu et lamentatione, sanguine detracto liberior; 12mo, stertorosus.
II.	Die 5to nulla.	Die 2do, anhelosus, suspiriosus; 3tio suspiriosus, intercisus.
III.	Screatu sanguineo; die 2do cruore mista ad 11mum; 11mo larga, coacta, salutaris flavedine tincta; 13tio repente suppressa.	
K.	Spumosa, nigricantia, parca; die 4to et 5to, sanguinis missione, 6to reducta.	Laboriosus; die 6to, gravior et sonantior.
I.	Tussis serena.	Anhelans, erecto corpore.
I.	Tussicula dolores augens.	Die 3tio et sanguine misso cruenta; 4to suppressa.

TABULA XII.

TUSSIS. SPUTA. SPIRITUS.

Tussicula die 3tio pertinax.	Pauca, arida, die 2do cruenta; 3tio cruenta; 4to magis coacta, copiosiora, et sanguineis tantum striis distincta; 5to plane suppressa.	Interceptus dolore, die 2do suspiriosus, laboriosus; sanguine detracto facilius, ut et omnia; altera detractio liberior; 5to suspiriosus, laboriosus, et inter trahendum molestissimus, cum stridore sonoro, plane interclusus.
------------------------------	--	---

Remanens cum summo dolore.

T A B U L A XII. Continuata.

TUSSIS.

S P U T A.

S P I R I T U S.

- II. Die 2do tussendi inanis cupiditas. Die 2do spumosa, pauca, sanguineis striis distincta; noctu suppressa; 3tio sanguine detracto notabiliter copiosa, cum modica molestia, sed adhuc spumosa, incocta, et sanguine florido tincta; 4to penitus fere suppressa; vespere 5to facilia, larga, cocta, salutari flavedine tincta. Die 1mo suspiriosus, anhelans, noctu suspensus, interceptus; 3tio sanguine detracto liberior, reductis viribus.
- III. Joannis Tussis. Tussicula aliquamdiu remansit. Cruenta, rejectu difficillima; die 3tio, faciliora sanguine e brachio abducto. Die 3tio liberior, sanguine e brachio ablato.
- IV. Petri Tussis. Tussicula aliquamdiu remansit. Cruenta, rejectu difficillima; die 3tio sanguinis, quantum e brachio alterius, ex hujus pede detractum; 4to cocta, incruenta. Die 4to liberior.
- V. Tussendi inanis et anxia cupiditas. Sanguine tincta; die 4to sanguine adhuc tincta; 8vo, cocta pinguis, flava, incruenta, copiosa, citra molestiam. Angustissimus, die 4to liberior.
- VI. Die 5to sanguinea; 6to suppressa; 7mo, ex scretu difficillima. Difficilis; 6to arduus, sanguine detracto liberior; nocte 6ta molestus, difficilis.
- VII. Tussis. Die 12mo inanis. Cruenta; 11mo multa, cocta cum levamine rejecta; 12mo intercepta; 13tio remediorum usu cocta, multa sine molestia. Interceptus; die 8vo intrahendum dolentissimus; dein liberior; 10mo cum tremore horrendo, nocte faciliior.
- VIII. Die 4to tussendi inanis et creber conatus. Die 5to circa meridiem multa, spumosa, cruore mista, nocte 5ta parciore; die 7mo matura, cocta, flava, nullo dehinc sanguine tincta; 11mo cocta, flava, pinguis. Difficillimus; die 2do afflictissimus; 4to anhelosus; 5to promptior, nocte 5ta difficilior.
- XI. Tussis diebus 3tio, 4to, 5to facilis; 5to ferocissima; diebus 7mo, 8vo, 9no, 10mo, 11mo, quievit. Cruore mista; 5to sub noctem suberassa, sanguinis aliquo adhuc tincta, facile rejecta. Anhelus, laboriosus, suspiriosus; die 2da post venam incisam liberior.
- X. Tussis serena; 5to Vitelli ovi instar flava, spissa, tenacia, supra fidem copiosa.

TABULA XIII.

DECUBITUS.

X.

*Affecto latere.**Non affecto latere.**Neutro latere.*

3. Dextro.
 16. In dolente, pariter, sed magis affecto, nempe sinistro, sed minime in dextro.
 33. Dextro, et solo hoc.
 35. Sinistro et solo hoc.
 43. Dextro, et solo hoc; in sinistrum recumbens expiravit.
 47. Dextro, ubi dolor, et affectio intus.
 49. Sinistrum non multum dolens, et detracto sanguine in omni parte facilis. Intus sinistrorsum magis affectio.

17. Non affecto latere, nempe dextro et in dorso.
 41. Dextro, ante mortem in utrovis facilis.
 47. Sinistro, ubi sine dolore affectio intus, sed minor potius.
 51. Sinistro, non dolente, nam solus pectoris dolor memoratur, sed intus plurimum affecto.
 53. Nonnihil in latere sinistro, non dolente, sed intus versus dorsum affecto.
 55. Dextro, nam sinister et dolebat, et intus aegrotabat.
 59. Sinistro, sed dextrum dolebat, et intus laborabat.

9. Erecta cervice spiritus, dolente latere dextro.
 13. Supino, erecta cervice spiritus; dolente latere dextro.
 26. In neutro latere facilis, dextro difficilior, sola erecta cervice spiritus; pars dolens reticetur.
 30. Dextro latere dolente.
 45. In neutro latere, sinister dolebat et intus affectus erat.
 53. In dorso, cui intus respondentia laborabant. Hic igitur in parte, si minus in latere affecto decubitus facilior.

XI.

24. Dextro latere, neutro dolente, nam dolor thoracis ita interior erat, ut sedes ejus designari non posset, pulmonum corpore intimo inflammato.
 31. In dextro latere commodior, quia in sinistro jacenti tussis movebatur. Pulmo sinister pleurae adhaerebat aliter vitatus.

17. In dorso, affectione intus et dolenti parati, nempe dextrae thoracis, et in quam recubitus erat, respondentem.
 19. In dorso; intus mira insolita externum affectum elare non explicant.
 23. Supino, cum doleret latus dextrum, dexterque magis vitaretur pulmo.
 27. Neutro in latere, licet primum alterum, dein alterum, dolerent.
 29. In dorso, dolente sinistro latere; parietibus thoracis pulmones undique, etiam diaphragmati, adhaerebant.

TABU.

T A B U L A XIII. Continuata.

*Affecto latere.**Non affecto latere.**Neutro latere.*

30. In utrovis latere, cum sternum interius inferiusque doleret.

36. In dorso, cum toto thorace doleret, pulmones undique thoracis parietibus adhaerebant.

Quam bene haec ratio Cleghornianæ conveniat, facile et obvium visu est. Is, utrumcunque latus afficeretur, dolore intelligit, in contrario facillimum decubitum esse, sed plerosque supinos jacere, aut erectos sedere confirmavit. Ita hic quoque paucissimi in affecto latere, plures in contrario, plurimi in neutro, sed in tergo jacuerunt, aut erecta cervice federunt:

T A B U L A XIV.

D O L O R.

XX.

*Lateris dextri.**Sinistri.**Alibi thoracis.*

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|
| 3 | 5 Ponderis sensus. | |
| 9 Gravativus ad scapulam vergens. | 7 | |
| 13 | 16 Primum. | 11 Thoracis, præcipue circa sternum. |
| 16 Postea. | 17 Levis, obtusus. | 13 In medio sterni. |
| | | 45 A sterno usque ad medios abdominis musculos ad mammillam sinistram et costas nothas magnus. |
| 20 Prius. | 20 Dein. | 51 Pectoris. |
| 30 Infra costas nothas et sternum. | 35 Pungens. | 53 In medio thoracis. |
| 33 Gravando potius molestus. | 39 Pungens. | |
| 41 Pungens. | 49 Pungens. | |
| 43 Fixus, pungens. | 55 Pungens. | |
| 47 Pungens. | | |
| 59 | | |
| 61 | | |

TABULA XIV. Continuata.

Lateri dextri.

Sinistri.

Alibi thoracis.

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 17 Anterius, pungens. | 19 Infra sinistram mam- | 24 Thoracis internus. |
| 23 Pungens. | mam pungens. | |
| 27 In altero, dein in alte- | 27 In altero, dein in altero | 30 In inferiore sterno le- |
| ro latere dolor, in | latere dolor, in tho- | viter pungens. |
| thorace ponderis | race sensus ponderis. | |
| sensus. | 29 Pectoris pungens in- | 36 Toto pectore, sed ma- |
| 34 Gravans. | fra mammam sin- | gis ad inferiora, pun- |
| | stram. | gens. |
| 24 Ita intus, ut sedes, nem- | 32 Ad imam legitimam | |
| pe, doloris, non ef- | costam sinistram, de- | |
| fet designanda. | in abiit dolor. | |
| 33 Utro in latere } VII. | 35 Pungens, dein gravans. | |
| siletur. | | |
| 26 Pars dolens non dici- | 11 Vehemens. | |
| tur. | | |

TABULA XV.

DOLOR

Dextri lateris.

Sinistri.

Alibi thoracis.

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| Acuti continui. | II. | Acerbi. | XV. Acuti, continui, modo |
| Satis atroces. | III. | Lancinatio ad sca- | costas superiores, mo- |
| Die primo, atroces. | | pulas usque. | do inferiores, modo |
| Praeacutus. | IV. | Juges. | claviculam aut sca- |
| Acer mordens. | VII. | Fixus, pungens. | pulam afficientes. |
| Lancinatio, ejusdem | VIII. | Die 2do ex sangui- | |
| lateris scapulam | | nis detractione. | |
| afficiens. | XIV. | Lancinantes. | |
| Gravans, et obscu- | XX. | Acutus, fixus. | |
| rus. | XXI. | Dolores totum sin- | |
| Acerbissimus. | | istrum latus a cla- | |
| Die primo lancina- | | vicula usque ad | |
| tio lateralis; 6to | | ultimas veras co- | |
| claviculae et to- | | stas; die 3tio a- | |
| tius brachii dex- | | troces. | |
| tri gravans. | XXIII. | Praeacutus, pun- | |
| Die 2do in latere | | gens; die 1mo | |
| dextro premens, | | brachium quo- | |
| mox 3tio sub an- | | que vexat. | |
| gulo inferiore sca- | XXV. | Acerbus. | |
| pulae, mox intra | XXVIII. | Obscurus et gravans, | |
| quintam, sextam, | | sub tussi acutus; | |
| et septimam ve- | | | |
| ram costam, lan- | | | |
| cinat; | | | |

T A B U L A XV. Continuata.

D O L O R.

*Dextri lateris.**Sinistri.**Alibi thoracis.*

- XIX. Ponderis, toto thorace, et in primis pulmone dextro sensus, dolores ex tussi frequente accuti.
- XXII. Lancinantes; die 4to faeviores.
- XXIV. Pungens, die 8vo ex latere in claviculam migravit.
- XXV. Die 2do in dextrum mutuo contactu propagatus.
- XXVI. Continuus, pungens.
- XXVII. Pungens, acerbus.
- XXXI. Claviculae quoque et scapulae faevissimus.
- XXXII. Claviculae quoque, acutus et lancinans.
- XXIX. Acutus claviculae quoque; die 7mo ex sputo immixto pungens.
- XXX. Saevissimus capitis quoque.
- XVIII. Incerti lateris.

T A B U L A XVI.

D O L O R.

*Dextri lateris.**Sinistri.**Alibi thoracis.*

- I. Acutissimus punctorius.
- II. Die 8vo, finito, faeva pleuritis.
- IV. Die 3tio dextrum infestans.
- V. Thoracis obscurus et gravans, in lancinantem die 3tio mutatus, in dextro latere faevior.
- VI. Lancinans.
- VII. Acutissimus.
- IV. Pali instar, fixus ac punctorius.
- VI. In sanum sinistram die 4to mutatus.
- VII. Die 4to utrumque latus occupat.
- VIII. Compungens.
- IX. Acer, mordens, pungens.
- X. Spiritus officina insolito pondere premittitur; dolores tussicula adauget.
- III. In scrobiculo cordis fixus ac intolerabilis.

TABULA XVII.

DOLOR

*Dextri lateris.**Sinistri.**Alibi thoracis.*

Obscurus et gravans in
verarum et spuriarum
costarum confinio,
mox acerbi lancinans.

Acutus pali instar fixus,
intensos dolores
pungentes excitans.

Puncturae magis exacerbatae.

Puncturae magis exacerbatae.

Acutissimus, pungens.

Acuta pleuritis.

I. Atrocissima pleuritis
fixa.

II. Longe acerbissimus.

Exquisitus pungens.

Acutus et lancinans.

X. Acutus et lancinans.

TABULA XVIII.

DECUBITUS MAXIME TOLERABILIS

*Dolente latere dextro.**Sinistro.**Alibi thoracis.*

XX.

3

9 Erecta cervice

13 Supino, erecta cervice. 16

16 Non in dextro latere. 17

30 Supino et in neutro latere. 35

33 In dextro latere solo. 49

41 Non in dextro latere. 55

43 In dextro latere solo, in sinistro mortua est. 59

47 In utrolibet latere.

11 Erecta cervice.

13 Supino, erecta cervice.

26 In neutro latere facilis,

in sinistro difficilior,

erecta cervice sola

spiritus.

45 In neutro latere.

51 Prius plerumque, dein

semper in sinistro latere.

53 In dorso, et nonnihil

in latere sinistro, erecta cervice spiritus.

T A B U L A VIII. Continuata.

DECUBITUS MAXIMÉ TOLERABILIS

*Dolente latere dextro.**Sinistro.**Alibi thoracis.*

XXI. 17 In dorso.

23 Supino.

27 Neutro in latere.

34 Erecto corpore spiri-
tus.

19 In dorso duntaxat.

27 Neutro in latere.

29 Non in sinistro latere,
sed in dorso.32 In dextro latere com-
modior, quia in sini-
stro tussis moveba-
tur.24 In dextro latere, non
in sinistro, non in
tergo.

27 Neutro in latere.

29 In dorso.

30 In utrovis latere.

VII. II An, ob delirium decu-
buisse supinum, mi-
nus refert?

In tabula quinta febris dolori non prior, immo aliquando posterior, ratione xxv ad iv; in septima ratione vii ad iii; in octava xx ad x est. Tabulae sextae, cujus casus selecti, quod communiter fit, non ostendunt, ideo mentio non fit. Sed febris dolori, quam hujus illi, antecedentis ratio, multo quam credi poterat, minor est. De qua re Cleghornium consule. Sed, quare non aliquandiu et manifesto intervallo, ut in reliquis, excepto rheumatismo, phlegmasiis febris dolor anteit? An quia in pulmonum sensibili minus, teste Hallero, membrana, aliquando prius formata inflammatio est, quam sensibilitas, quam solus morbus infert, tanta inferatur, quanta doloris sensum recipiat? Rheumatismi, hanc rem respicientis, ratio neque hujus loci est, neque, si esset, ulla nobis, solas res veras tractantibus, ratio attingenda est. Sed, quoniam solae fere omnium phlegmasiarum hae duae sunt, in quibus dolor perpetuo febris non praecedat, certe inde, nostrae istius ordinis nosologiae quam scite pathologia, quae ex locali vitio pyrexiam communem pendere ponit, conveniat, et naturalem ordinem det, nemini non patebit.

De tussi, sputis et spiritu eo prolixius et accuratius in tabulis, nona, decima, undecima et duodecima, actum est, quod magni momenti ea symptomata sunt, et ad iudicium tam praesentis morbi naturae, quam futuri status, ducunt. Quod tamen iudicium quae dirigat nullam, qualis e tabularum casibus deduci possit, conclusionem deducendam, sed rem integram lectoris relinquendam, eo magis existimo, quod, rebus expositis, de iis iudicare illorum est, idque iis praeripere angustia temporis

temporis vector. Nec, ob eandem causam, conclusione omni prognosin, quamvis ad historiam partim attinente, solum abstinui, sed eandem respicientes tabulas nullas dedi, historiam simpliciore quae supra tradita est contexuisse, et rerum investigatione exploravisse contentus, et, quicquid supra id ad inceptum perficiendum reliqui esse videatur, aliis relicturus, aut ipse per otium forsitan olim intermissum opus repetiturus. Denique, exempli potius dandi causa, quam moduli ulla ex parte absoluti, ostendendi spe, laborem tantum aggressus sum. Ad neglectam nimis medicinae studiorum partem, cadaverum investigationem, hujus academiae juventutem revocare, et magni Morgagnii utile opus commendare, volui; et, quoniam historiae hujus sententiam et paene ipsa verba, ab illustri viro Culleno, potissimum accepi, quam is inter tantas ingenii occupationes, quibus artem medicam erroribus liberavit, rationibus explanavit, ex farragine perplexa in ordinem pulcherrimum explicavit, et omnia rebus veris firmavit, labores quoque graves, et ex aliis gravissimum, toedioque plenum illum, qui in cadaverum incisionibus perscrutandis versatur, non neglexerit, ostendere.

Jamque quinquennali studiorum cursu hic finito, meis in hac academia Praeceptoribus, ob pulcherrima praecepta, quae addiscendi mihi copiam fecere, decedens gratias ago.

F I N I S.





